

## ***INFORMACIÓN PARA LA PACIENTE SOBRE EL HISTEROSALPINGOGRAMA (HSG, por sus siglas en inglés)***

### **¿Qué es el HSG y cuál es su propósito?**

Un histero- (útero) salpingo- (trompa de Falopio) grama son rayos X de las trompas de Falopio y del útero. Su propósito es determinar si las trompas de Falopio están abiertas y sin enfermedades; además, el estudio evalúa la presencia de anomalías en la cavidad uterina. El examen lo realiza un radiólogo. Durante el examen, el radiólogo coloca un espéculo en la vagina para visualizar el orificio cervical (la abertura hacia el útero) e inserta en el agujero cervical un instrumento llamado cánula. La cánula es un tubo por donde se inyecta medio de contraste (o tinte). El medio de contraste (tinte) hace un trazado del útero y de las trompas de Falopio por medio del uso de fluoroscopia (una máquina de rayos X con una pantalla similar a un televisor). Por lo general el examen dura menos de 30 minutos.

### **Cuándo y cómo programarlo**

Esta prueba se programa después que deja de sangrar y antes de la ovulación. El momento oportuno es crucial para la efectividad del procedimiento y la seguridad de la paciente. Es mejor realizar el HSG entre el 6<sup>to</sup>. y 12<sup>vo</sup>. día después del inicio del ciclo menstrual regular. Cuando decida programar su HSG, llame a **Fertility Consultants** y háganoslo saber. Enviaremos por fax una orden al centro.

Usted puede programar su HSG en **epic™ IMAGING** – [www.epicimaging.com](http://www.epicimaging.com), ya sea en el centro del Este o del Oeste (mapas de ubicación, direcciones y números telefónicos en la página siguiente). Si es posible, quisiéramos programar estas pruebas con la Dra. Amy Thurmond, la Dra. Jennifer Mayberry o la Dra. Maureen Filipek, radiólogas especializadas en reproducción femenina.

Cuando usted inicie su período, llámeles por teléfono y ellos lo programarán para el momento apropiado.


### **Premedicación**

Durante el procedimiento podría experimentar espasmos similares a los del ciclo menstrual. Para ayudarla a aliviarlos, se recomienda que tome 800 mg de ibuprofeno 30 minutos antes del procedimiento. Esta medicina se puede comprar sin prescripción (Advil o Nuprin). Cada una de estas tabletas sólo contienen 200 mg de ibuprofeno, por lo que deberá tomar cuatro tabletas. Asimismo, debido a que éste es un procedimiento invasivo, es obligatorio que tome una cobertura de antibiótico profiláctico. Por favor informe a su médico si es alérgica a este medicamento u otros antibióticos. Le entregaremos una prescripción para el medicamento o llamaremos a la farmacia de su elección. La manera apropiada de tomar este medicamento es de la siguiente manera. No tome el ibuprofeno o el antibiótico con el estómago vacío ya que puede causarle molestias.

- Doxiciclina, 100 mg, dos veces al día (una por la mañana y una por la tarde, con 12 horas de diferencia)
- Tome estos medicamentos durante un total de cinco días, empezando dos días antes del procedimiento.


### **Seguimiento**

La radióloga y su médico revisarán la grabación de su HSG. Después el médico le explicará los resultados de su HSG y la ayudará con cualquier tratamiento adicional, si es necesario. Por lo general esto toma de 7 a 10 días. Si durante este período no ha tenido noticias de parte nuestra, por favor llámenos para sus resultados al (503) 418-3700.



233 NE 102nd Avenue Portland, OR 97220  
Phone: 503-253-1105

El centro del Este se encuentra en NE 102nd Avenue entre Burnside y Glisan a poca distancia del Mall 205. Hay amplio estacionamiento disponible. Tome I-205 en dirección norte o sur hacia la salida Glisan Street.



8950 SW Nimbus Avenue Beaverton, OR 97008  
Phone: 503-643-7226

Nuestro centro West se encuentra en Nimbus a poca distancia del Washington Square Mall. Hay amplio estacionamiento y acceso amigable para las pacientes en nuestra entrada principal. En dirección norte por 217, la salida Scholls Ferry Road es la ruta más rápida. En dirección sur por 217, tome la salida Progress.